

З в і т

про основні показники наукової діяльності кафедри внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією за III квартал 2026 року Лавренко А.В.

Таблиця 1

<i>Найменування завдання</i>	<i>Найменування показників виконання завдання (Стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення), конференції (програма)</i>	<i>Одиниця виміру</i>	<i>Очікувані результати</i>	<i>Фактично досягнуто</i>
1	2	3	4	5
Найменування завдання (дослідити)		Шт	мета	Висновки
Провести науковий аналіз знайдених джерел та узагальнити наявні доказові ефективності застосування багатой тромбоцитами плазми в омолодженні шкіри обличчя та стандартизувати протоколи лікування.	Застосування збагаченої на тромбоцити плазми для омолодження шкіри обличчя: аналіз актуальних наукових публікацій (огляд літератури). Лавренко А.В./Проблеми екології та медицини. //Том 30, №2, 2026.	7	Метою огляду є науковий аналіз знайдених джерел та узагальнення наявних доказів ефективності застосування багатой тромбоцитами плазми в омолодженні шкіри обличчя, з особливою увагою до якісних порівняльних досліджень.	Проведений аналіз досліджень доводить ефективність застосування PRP для омолодження шкіри та підкреслює необхідність стандартизації протоколів підготовки PRP у майбутніх дослідженнях.
Визначити клініко-патогенетичні особливості перебігу бронхіальної астми у пацієнтів із супутньою	Коморбідний перебіг бронхіальної астми та ішемічної хвороби серця: патогенетичні, клінічні та функціональні аспекти. Авраменко Я.М., Белан О.В., Дігтяр Н.І., Лавренко А.В., Герасименко Н.Д., Остапенко М.М. / Імунологія та алергологія: наука і	6	Вивчити клініко-патогенетичні особливості бронхіальної астми у пацієнтів із супутньою ішемічною хворобою серця	оморбідний перебіг бронхіальної астми та ішемічної хвороби серця характеризується

ішемічною хворобою серця шляхом оцінки впливу факторів серцево-судинного ризику та клінічних проявів ІХС на ступінь контролю БА і показники функції зовнішнього дихання, а також встановити взаємозв'язок між маркерами системного запалення, станом ендотеліальної функції та тяжкістю клінічного перебігу обох захворювань	практика. 2026. № 2. DOI: 10.37321/immunology.2026.2-07.		та встановити взаємозв'язки між показниками функції зовнішнього дихання, маркерами системного запалення та станом ендотеліальної функції.	взаємним обтяженням клінічного стану пацієнтів, недостатнім контролем БА (у 75% обстежених) та високою частотою нападів стенокардії. Виявлено ознаки ендотеліальної дисфункції; встановлено кореляційні зв'язки між показниками ендотеліальної функції, ОФВ₁ та рівнем загального холестерину. Підвищення рівня С-реактивного білка та гіперхолестеринемія асоціюються з більшою частотою нападів стенокардії, що підтверджує роль системного запалення у прогресуванні ІХС на тлі БА.
---	---	--	--	--