

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

КРОК 2

25 ситуаційних задач

1.Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії у хворого раптово з'явилася нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання.

Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який діагноз у хворого?

1.Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після **проведення анестезії** у хворого раптово з'явилася нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання.

Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, **артеріальний тиск не визначається**. Який діагноз у хворого?

- А. Непритомність
- В. Анафілактичний шок
- С. Епілептичний напад
- Д. Травматичний шок
- Е. Колапс

1.Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після **проведення анестезії** у хворого раптово з'явилася нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання.

Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, **артеріальний тиск не визначається**. Який діагноз у хворого?

А. Непритомність

В. Анафілактичний шок

С. Епілептичний напад

Д. Травматичний шок

Е. Колапс

2. У пацієнта 42-х років на прийомі у стоматолога після застосування анестетика розвинувся анафілактичний шок. Який лікувальний засіб першої лінії невідкладної допомоги слід застосувати?

2. У пацієнта 42-х років на прийомі у стоматолога **після застосування анестетика** розвинувся анафілактичний шок. Який лікувальний засіб першої лінії невідкладної допомоги слід застосувати?

А. Кисень

В. Супрастин

С. Преднізолон

Д. Адреналін

Е. Сальбутамол

2. У пацієнта 42-х років на прийомі у стоматолога **після застосування анестетика** розвинувся анафілактичний шок. Який лікувальний засіб першої лінії невідкладної допомоги слід застосувати?

А. Кисень

В. Супрастин

С. Преднізолон

Д. Адреналін

Е. Сальбутамол

3.Пацієнт, що хворіє на ІХС, стенокардією напруги, скаржиться на раптовий сильний стискаючий біль за грудиною більше 30 хвилин з іррадіацією в ліву руку, який виник при фізичному навантаженні. Напад болю не зник після прийому 3 пігулок нітрогліцерину. При огляді: шкіра блідо-сірого кольору, волога, холодна на дотик, загострені риси обличчя, акроціаноз, пульс - 102/хв., аритмічний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз:

3.Пацієнт, що **хворіє на ІХС, стенокардією напруги**, скаржиться на раптовий сильний стискаючий **біль за грудиною більше 30 хвилин** з іррадіацією в ліву руку, який виник при фізичному навантаженні. Напад болю **не зник після прийому 3 пігулок нітрогліцерину**. При огляді: шкіра блідо-сірого кольору, волога, холодна на дотик, загострені риси обличчя, акроціаноз, пульс - 102/хв., аритмічний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз:

- А. Гострий інфаркт міокарда
- В. Напад стенокардії
- С. Кардіалгія
- Д. Стабільна стенокардія
- Е. Гіпотонія

3.Пацієнт, що **хворіє на ІХС, стенокардією напруги**, скаржиться на раптовий сильний стискаючий **біль за грудиною більше 30 хвилин** з іррадіацією в ліву руку, який виник при фізичному навантаженні. Напад болю **не зник після прийому 3 пігулок нітрогліцерину**. При огляді: шкіра блідо-сірого кольору, волога, холодна на дотик, загострені риси обличчя, акроціаноз, пульс - 102/хв., аритмічний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз:

А. Гострий інфаркт міокарда

В. Напад стенокардії

С. Кардіалгія

Д. Стабільна стенокардія

Е. Гіпотонія

4. На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з приводу різкого болю в зубі. Напередодні у нього з'явився нежить, у зв'язку з чим перед відвідуванням стоматолога він прийняв парацетамол. В кабінеті стоматолога у нього розвинувся набряк губ, повік, обличчя, голос став хрипким, з'явився "гавкаючий кашель", наростаюча задишка. Який загрозливий стан розвивається у пацієнта на фоні набряку Квінке?

4. На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з приводу різкого болю в зубі. Напередодні у нього з'явився нежить, у зв'язку з чим перед відвідуванням стоматолога він **прийняв парацетамол**. В кабінеті стоматолога у нього розвинувся набряк губ, повік, обличчя, **голос став хрипким, з'явився "гавкаючий кашель", наростаюча задишка**. Який загрозовий стан розвивається у пацієнта на фоні набряку Квінке?

- А. Набряк гортані
- В. Гостра серцева недостатність
- С. Бронхообструктивний синдром
- Д. Кропив'янка
- Е. Анафілактичний шок

4. На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з приводу різкого болю в зубі. Напередодні у нього з'явився нежить, у зв'язку з чим перед відвідуванням стоматолога він **прийняв парацетамол**. В кабінеті стоматолога у нього розвинувся набряк губ, повік, обличчя, **голос став хрипким, з'явився "гавкаючий кашель", наростаюча задишка**. Який загрозливий стан розвивається у пацієнта на фоні набряку Квінке?

А. набряк гортані

В. Гостра серцева недостатність

С. Бронхообструктивний синдром

Д. Кропив'янка

Е. Анафілактичний шок

5. Пацієнт звернувся до стоматолога для санації. Хворий страждає на цукровий діабет. За 30 хв. до відвідування лікаря йому ввели інсулін, після чого він з'їв яблуко. Через 1 час після огляду у пацієнта з'явилося почуття неспокою і голоду, тремтіння в тілі, двоїння в очах, блідість, великі краплі поту, язик вологий, запах ацетону з рота відсутній, очні яблука в гіпертонусі. Пульс частий, напружений, АТ- 130-90 мм рт.ст. Тони серця звучні, дихання рівне. Поставте діагноз:

5. Пацієнт звернувся до стоматолога для санації. Хворий **страждає на цукровий діабет**. За 30 хв. до відвідування лікаря йому **ввели інсулін, після чого він з'їв яблуко**. Через 1 час після огляду у пацієнта з'явилося почуття неспокою і голоду, тремтіння в тілі, двоїння в очах, блідість, великі краплі поту, язик вологий, запах ацетону з рота відсутній, очні яблука в гіпертонусі. Пульс частий, напружений, АТ- 130-90 мм рт.ст. Тони серця звучні, дихання рівне. Поставте діагноз:

А. Колапс

В. Непритомність

С. Анафілактичний шок

Д. Гіпоглікемічна кома

Е. Гіперглікемічна кома

5. Пацієнт звернувся до стоматолога для санації. Хворий **страждає на цукровий діабет**. За 30 хв. до відвідування лікаря йому **ввели інсулін, після чого він з'їв яблуко**. Через 1 час після огляду у пацієнта з'явилося почуття неспокою і голоду, тремтіння в тілі, двоїння в очах, блідість, великі краплі поту, язик вологий, запах ацетону з рота відсутній, очні яблука в гіпертонусі. Пульс частий, напружений, АТ- 130-90 мм рт.ст. Тони серця звучні, дихання рівне. Поставте діагноз:

А. Колапс

В. Непритомність

С. Анафілактичний шок

Д. Гіпоглікемічна кома

Е. Гіперглікемічна кома

6. У хворого під час проведення туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки, що швидко наростав і поширився в скроневу ділянку. Яке ускладнення, імовірно, розвинулося в цій клінічній картині?

6. У хворого під час проведення туберальної анестезії **внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки**, що швидко наростав і поширився в скроневу ділянку. Яке ускладнення, імовірно, розвинулося в цій клінічній картині?

А. Набряк Квінке

В. Абсцес

С. Емфізема

Д. Гематома

Е. Ішемія

6. У хворого під час проведення туберальної анестезії **внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки**, що швидко наростав і поширився в скроневу ділянку. Яке ускладнення, імовірно, розвинулося в цій клінічній картині?

А. Набряк Квінке

В. Абсцес

С. Емфізема

Д. Гематома

Е. Ішемія

7. На прийомі у стоматолога після лікування 26-го зуба у пацієнтки 46 років раптово з'явилися пульсуючий головний біль, запаморочення, шум у вухах, тахікардія, артеріальний тиск 220/160 мм рт. ст. Поставте попередній діагноз:

7. На прийомі у стоматолога після лікування 26-го зуба у пацієнтки 46 років раптово з'явилися **пульсуючий головний біль**, запаморочення, шум у вухах, тахікардія, **артеріальний тиск 220/160 мм рт. ст.** Поставте попередній діагноз:

- А. Гостре порушення мозкового кровообігу
- В. Непритомність
- С. Анафілактичний шок
- Д. Гіпоглікемічна кома
- Е. Гіпертонічний криз

7. На прийомі у стоматолога після лікування 26-го зуба у пацієнтки 46 років раптово з'явилися **пульсуючий головний біль**, запаморочення, шум у вухах, тахікардія, **артеріальний тиск 220/160 мм рт. ст.** Поставте попередній діагноз:

- А. Гостре порушення мозкового кровообігу
- В. Непритомність
- С. Анафілактичний шок
- Д. Гіпоглікемічна кома
- Е. Гіпертонічний криз**

8. Жінка 27 років звернулася до стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії хвора поскаржилася на запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах, загальну слабкість. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, укрита холодним потом. Пульс - 94/хв., слабого наповнення і напруження, артеріальний тиск - 96/60 мм рт. ст. Спостерігалась короткочасна втрата свідомості на 30 секунд. Який невідкладний стан розвинувся у хворої?

8. Жінка 27 років звернулася до стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії хвора поскаржилася на **запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах**, загальну слабкість. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, укрита холодним потом. Пульс - 94/хв., слабого наповнення і напруження, **артеріальний тиск - 96/60 мм рт. ст.** **Спостерігалась короткочасна втрата свідомості на 30 секунд.** Який невідкладний стан розвинувся у хворой?

- А. Колапс
- В. Гіпертонічний криз
- С. Непритомність
- Д. Гіперглікемічна кома
- Е. Гостра серцева недостатність

8. Жінка 27 років звернулася до стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії хвора поскаржилася на **запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах**, загальну слабкість. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, укрита холодним потом. Пульс - 94/хв., слабого наповнення і напруження, **артеріальний тиск - 96/60 мм рт. ст.** **Спостерігалась короткочасна втрата свідомості на 30 секунд.** Який невідкладний стан розвинувся у хворої?

А. Колапс

В. Гіпертонічний криз

С. Непритомність

Д. Гіперглікемічна кома

Е. Гостра серцева недостатність

9. У чоловіка 56 років під час отримання повного анатомічного відбитку верхньої щелепи альгінатною масою виникли різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся?

9. У чоловіка 56 років під час отримання повного анатомічного відбитку верхньої щелепи альгінатною масою виникли різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся?

- А. Гострий бронхіт
- В. Пневмоторакс
- С. Напад бронхіальної астми
- Д. Підвищений блювотний рефлекс
- Е. Аспіраційна асфіксія

9. У чоловіка 56 років під час отримання повного анатомічного відбитку верхньої щелепи альгінатною масою виникли різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся?

А. Гострий бронхіт

В. Пневмоторакс

С. Напад бронхіальної астми

Д. Підвищений блювотний рефлекс

Е. Аспіраційна асфіксія

10. Жінці 50 років, яка страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, робиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин; вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом, втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги в такій клінічній ситуації?

10. Жінці 50 років, яка страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, робиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин; вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом, втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги в такій клінічній ситуації?

- А. Розчин аміаку
- В. Розчин глюкози
- С. Інсулін
- Д. Валокордин
- Е. Нітрогліцерин

10. Жінці 50 років, яка страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, робиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин; вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом, втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги в такій клінічній ситуації?

А. Розчин аміаку

В. Розчин глюкози

С. Інсулін

Д. Валокордин

Е. Нітрогліцерин

11. У пацієнта 29 років під час стоматологічного втручання та проведення анестезії раптово виник щільний набряк шкіри в ділянці обличчя та шиї, без вираженого свербіння, який супроводжувався кашлем і диханням зі свистом. Який діагноз імовірний у цьому разі?

11. У пацієнта 29 років під час стоматологічного втручання та проведення анестезії раптово виник щільний набряк шкіри в ділянці обличчя та шиї, без вираженого свербіння, який супроводжувався кашлем і диханням зі свистом. Який діагноз імовірний у цьому разі?

- А. Контактний дерматит
- В. Напад бронхіальної астми
- С. Кропивниця
- Д. набряк Квінке
- Е. Анафілактичний шок

11. У пацієнта 29 років під час стоматологічного втручання та проведення анестезії раптово виник щільний набряк шкіри в ділянці обличчя та шиї, без вираженого свербіння, який супроводжувався кашлем і диханням зі свистом. Який діагноз імовірний у цьому разі?

А. Контактний дерматит

В. Напад бронхіальної астми

С. Кропивниця

Д. набряк Квінке

Е. Анафілактичний шок

12. Чоловік 42 років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії у хворого раптово з'явилися нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання. Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який діагноз у хворого?

12. Чоловік 42 років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після **проведення анестезії** у хворого раптово з'явилися нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання. Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, **артеріальний тиск не визначається**. Який діагноз у хворого?

- А. Непритомність
- В. Епілептичний напад
- С. Колапс
- Д. Анафілактичний шок
- Е. Травматичний шок

12. Чоловік 42 років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після **проведення анестезії** у хворого раптово з'явилися нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання. Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, **артеріальний тиск не визначається**. Який діагноз у хворого?

А. Непритомність

В. Епілептичний напад

С. Колапс

Д. Анафілактичний шок

Е. Травматичний шок

13. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття «скутості» у грудній клітці. У пацієнтки спостерігається свистяче дихання з подовженим видихом та кашель. З анамнезу відомо, що такі симптоми виникають після попереднього контакту з алергенами чи повітряними іритантами. Який невідкладний стан виник у пацієнтки?

13. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття «скутості» у грудній клітці. У пацієнтки спостерігається свистяче дихання з подовженим видихом та кашель. З анамнезу відомо, що такі симптоми виникають після попереднього контакту з алергенами чи повітряними іритантами. Який невідкладний стан виник у пацієнтки?

- А. Напад бронхіальної астми
- В. Гостра серцева недостатність
- С. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення
- Д. Алергічний риніт
- Е. Гостра дихальна недостатність

13. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття «скутості» у грудній клітці. У пацієнтки спостерігається свистяче дихання з подовженим видихом та кашель. З анамнезу відомо, що такі симптоми виникають після попереднього контакту з алергенами чи повітряними іритантами. Який невідкладний стан виник у пацієнтки?

А. Напад бронхіальної астми

В. Гостра серцева недостатність

С. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення

Д. Алергічний риніт

Е. Гостра дихальна недостатність

14. У чоловіка віком 45 років після проведення туберальної анестезії різко з'явився набряк обличчя та шиї зі стертими межами, значний набряк губ, блідість шкіри, утруднене дихання, осиплість голосу. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

14. У чоловіка віком 45 років після проведення туберальної анестезії різко з'явився набряк обличчя та шиї зі стертими межами, значний набряк губ, блідість шкіри, утруднене дихання, осиплість голосу. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- А. Обтураційна асфіксія
- В. Набряк легень
- С. Напад бронхіальної астми
- Д. Епілептичний напад
- Е. Ангіоневротичний набряк

14. У чоловіка віком 45 років після проведення туберальної анестезії різко з'явився набряк обличчя та шиї зі стертими межами, значний набряк губ, блідість шкіри, утруднене дихання, осиплість голосу. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

А. Обтураційна асфіксія

В. набряк легень

С. Напад бронхіальної астми

Д. Епілептичний напад

Е. Ангіоневротичний набряк

15. У чоловіка віком 43 роки під час видалення зуба з'явилися різкий головний біль, запаморочення, нудота, миготіння перед очима, на шкірі шиї та обличчя - червоні плями. Пацієнт збуджений, має відчуття жару, тремтіння в усьому тілі. Наявна тахікардія, АТ - 190/110 мм рт. ст. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

15. У чоловіка віком 43 роки під час видалення зуба з'явилися різкий головний біль, запаморочення, нудота, миготіння перед очима, на шкірі шиї та обличчя - червоні плями. Пацієнт збуджений, має відчуття жару, тремтіння в усьому тілі. Наявна тахікардія, **АТ - 190/110 мм рт. ст.** Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- А. Анафілактичний шок
- В. Інсульт
- С. Гіпертензивна криза
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Напад стенокардії

15. У чоловіка віком 43 роки під час видалення зуба з'явилися різкий головний біль, запаморочення, нудота, миготіння перед очима, на шкірі шиї та обличчя - червоні плями. Пацієнт збуджений, має відчуття жару, тремтіння в усьому тілі. Наявна тахікардія, **АТ - 190/110 мм рт. ст.** Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

А. Анафілактичний шок

В. Інсульт

С. Гіпертензивна криза

Д. Інфаркт міокарда

Е. Напад стенокардії

16. Під час стоматологічного прийому пацієнт поскаржився на погане самопочуття. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкірного покриву, холодний піт, периферичні вени запалі, свідомість сплутана. Пульс - 130 уд/хв, ниткоподібний, аритмічний, слабкого наповнення. АТ - 80/40 мм рт. ст., дихання часте та поверхнєве. Встановіть діагноз.

16. Під час стоматологічного прийому пацієнт поскаржився на погане самопочуття. Об'єктивно спостерігається: **різка блідість шкірного покриву, холодний піт, периферичні вени запалі, свідомість сплутана.** Пульс - 130 уд/хв, ниткоподібний, аритмічний, слабкого наповнення. **АТ - 80/40 мм рт. ст.,** дихання часте та поверхнєве. Встановіть діагноз.

- А. Гіпертонічний криз
- В. Колапс
- С. Непритомність
- Д. Анафілактичний шок
- Е. Інфаркт міокарда

16. Під час стоматологічного прийому пацієнт поскаржився на погане самопочуття. Об'єктивно спостерігається: **різка блідість шкірного покриву, холодний піт, периферичні вени запалі, свідомість сплутана.** Пульс - 130 уд/хв, ниткоподібний, аритмічний, слабкого наповнення. **АТ - 80/40 мм рт. ст.,** дихання часте та поверхнєве. Встановіть діагноз.

А. Гіпертонічний криз

В. Колапс

С. Непритомність

Д. Анафілактичний шок

Е. Інфаркт міокарда

17. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда для протезування. Перед препаруванням твердих тканин інтактних зубів проведено інфільтраційне знеболювання 0,5%-м розчином лідокаїну. За декілька хвилин після введення розчину з'явилося пригнічення свідомості, падіння АТ, судоми, самовільне сечовипускання. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

17. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда для протезування. Перед препаруванням твердих тканин інтактних зубів проведено інфільтраційне знеболювання 0,5%-м розчином лідокаїну. За декілька хвилин після введення розчину з'явилося пригнічення свідомості, падіння АТ, судоми, самовільне сечовипускання. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- А. Больовий шок
- В. Анафілактичний шок
- С. Непритомність
- Д. Серцева недостатність
- Е. Колапс

17. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда для протезування. Перед препаруванням твердих тканин інтактних зубів проведено інфільтраційне знеболювання 0,5%-м розчином лідокаїну. За декілька хвилин після введення розчину з'явилося пригнічення свідомості, падіння АТ, судоми, самовільне сечовипускання. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

А. Больовий шок

В. Анафілактичний шок

С. Непритомність

Д. Серцева недостатність

Е. Колапс

18. Жінці віком 50 років, яка хворіє на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, проводиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин, вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом та втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги у цьому клінічному випадку?

18. Жінці віком 50 років, яка **хворіє на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету**, проводиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин, **вона не їла та знервувалася**. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, **вкрилася холодним потом та втратила свідомість**. Що є засобом невідкладної допомоги у цьому клінічному випадку?

- А. Розчин глюкози
- В. Інсулін
- С. Валокордин
- Д. Розчин аміаку
- Е. Нітрогліцерин

18. Жінці віком 50 років, яка хворіє на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, проводиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин, вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом та втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги у цьому клінічному випадку?

А. Розчин глюкози

В. Інсулін

С. Валокордин

Д. Розчин аміаку

Е. Нітрогліцерин

19. У чоловіка віком 32 роки під час проведення туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки, що швидко наростав і поширився у скроневу ділянку. Яке ускладнення ймовірно розвинулося у пацієнта?

19. У чоловіка віком 32 роки під час проведення туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки, що швидко наростав і поширився у скроневу ділянку. Яке ускладнення ймовірно розвинулося у пацієнта?

А. Набряк Квінке

В. Гематома

С. Емфізема

Д. Абсцес

Е. Ішемія

19. У чоловіка віком 32 роки під час проведення туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки, що швидко наростав і поширився у скроневу ділянку. Яке ускладнення ймовірно розвинулося у пацієнта?

А. Набряк Квінке

В. Гематома

С. Емфізема

Д. Абсцес

Е. Ішемія

20. У жінки віком 42 роки, яка хворіє на цукровий діабет, після фізичного навантаження з'явилися слабкість, серцебиття, збудження, тремор рук, потемніння в очах. Через декілька хвилин вона втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, нормального тургору. Пульс ритмічний, 88/хв, задовільного наповнення, АТ - 130/15 мм рт. ст. Дихання везикулярне. Тонус очних яблук не змінений. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. Який найімовірніший діагноз?

20. У жінки віком 42 роки, яка **хворіє на цукровий діабет**, після фізичного **навантаження** з'явилися слабкість, серцебиття, **збудження**, **тремор рук**, **потемніння в очах**. Через декілька хвилин вона **втратила свідомість**. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, нормального тургору. Пульс ритмічний, 88/хв, задовільного наповнення, АТ - 130/15 мм рт. ст. Дихання везикулярне. Тонус очних яблук не змінений. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гіперосмолярна кома
- В. Кетоацидотична кома
- С. Уремична кома
- Д. Молочнокисла кома
- Е. Гіпоглікемічна кома

20. У жінки віком 42 роки, яка **хворіє на цукровий діабет**, після фізичного **навантаження** з'явилися слабкість, серцебиття, **збудження, тремор рук, потемніння в очах**. Через декілька хвилин вона **втратила свідомість**. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, волога, нормального тургору. Пульс ритмічний, 88/хв, задовільного наповнення, АТ - 130/15 мм рт. ст. Дихання везикулярне. Тонус очних яблук не змінений. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гіперосмолярна кома
- В. Кетоацидотична кома
- С. Уремична кома
- Д. Молочнокисла кома
- Е. Гіпоглікемічна кома**

21.Пацієнту перед видаленням 28 зуба для знеболювання проведено туберальну та піднебінну анестезію, введено 0,5 мл. убістезину-форте. За декілька хвилин після введення препарату пацієнт зблід, на шкірі обличчя та ший з'явився висип, дихання стало утрудненим, свідомість сплутана. АТ - 50/0 мм рт. ст., пульс - 100/хв. Який препарат треба ввести пацієнту для надання невідкладної допомоги насамперед?

21.Пацієнту перед видаленням 28 зуба для знеболювання проведено туберальну та піднебінну анестезію, введено 0,5 мл. убістезину-форте. За декілька хвилин після введення препарату пацієнт зблід, на шкірі обличчя та шиї з'явився висип, дихання стало утрудненим, свідомість сплутана. АТ - 50/0 мм рт. ст., пульс - 100/хв. Який препарат треба ввести пацієнту для надання невідкладної допомоги насамперед?

- А. Кальцію хлорид
- В. Еуфілін
- С. Преднізолон
- Д. Димедрол
- Е. Адреналіну гідрохлорид

21.Пацієнту перед видаленням 28 зуба для знеболювання проведено туберальну та піднебінну анестезію, введено 0,5 мл. убістезину-форте. За декілька хвилин після введення препарату пацієнт зблід, на шкірі обличчя та шиї з'явився висип, дихання стало утрудненим, свідомість сплутана. АТ - 50/0 мм рт. ст., пульс - 100/хв. Який препарат треба ввести пацієнту для надання невідкладної допомоги насамперед?

А. Кальцію хлорид

В. Еуфілін

С. Преднізолон

Д. Димедрол

Е. Адреналіну гідрохлорид

22. Жінка віком 66 років у черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилася на погане самопочуття, з'явилися гострий стискаючий біль за грудниною, задишка. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкіри обличчя, тони серця звучні, систолічний шум над аортою. ЧСС - 94/хв, АТ - 230/120 мм рт. ст. Який невідкладний стан розвинувся в пацієнтки?

22. Жінка віком 66 років у черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилася на погане самопочуття, з'явилися гострий стискаючий біль за грудниною, задишка. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкіри обличчя, тони серця звучні, систолічний шум над аортою. ЧСС - 94/хв, АТ - 230/120 мм рт. ст. Який невідкладний стан розвинувся в пацієнтки?

- А. Напад стенокардії
- В. набряк Квінке
- С. Інфаркт міокарда
- Г. Гіпертонічний криз
- Е. Анафілактичний шок

22. Жінка віком 66 років у черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилася на погане самопочуття, з'явилися гострий стискаючий біль за грудниною, задишка. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкіри обличчя, тони серця звучні, систолічний шум над аортою. ЧСС - 94/хв, АТ - 230/120 мм рт. ст. Який невідкладний стан розвинувся в пацієнтки?

А. Напад стенокардії

В. набряк Квінке

С. Інфаркт міокарда

Г. Гіпертонічний криз

Е. Анафілактичний шок

23. Чоловік віком 45 років після видалення зуба лікарем-стоматологом поскаржився на різку слабкість, сильний розпираючий за груднинний біль, що іррадіює під ліву лопатку. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, ціаноз губ, АТ - 90/60 мм рт. ст., тони серця ритмічні, ослаблені, пульс ниткоподібний. Після триразового прийому нітрогліцерину біль не зменшився. Який стан розвивається у пацієнта?

23. Чоловік віком 45 років після видалення зуба лікарем-стоматологом поскаржився на різку слабкість, сильний **розпираючий за груднинний біль, що іррадіює під ліву лопатку**. Об'єктивно спостерігається: **блідість шкірних покривів, ціаноз губ, АТ - 90/60 мм рт. ст., тони серця ритмічні, ослаблені, пульс ниткоподібний**. **Після триразового прийому нітрогліцерину біль не зменшився**. Який стан розвивається у пацієнта?

- А. Інфаркт міокарда
- В. Напад стенокардії
- С. Колапс
- Д. Гіпертонічний криз
- Е. Кардіогенна форма анафілактичного шоку

23. Чоловік віком 45 років після видалення зуба лікарем-стоматологом поскаржився на різку слабкість, сильний розпираючий за груднинний біль, що іррадіює під ліву лопатку. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, ціаноз губ, АТ - 90/60 мм рт. ст., тони серця ритмічні, ослаблені, пульс ниткоподібний. Після триразового прийому нітрогліцерину біль не зменшився. Який стан розвивається у пацієнта?

А. Інфаркт міокарда

В. Напад стенокардії

С. Колапс

Д. Гіпертонічний криз

Е. Кардіогенна форма анафілактичного шоку

24. Під час лікування гострого пульпіту 35 зуба під інфільтраційною анестезією пацієнт віком 26 років поскаржився на головокружіння, шум у вухах, потемніння в очах. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, холодний піт, пульс слабкий - 110/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., втрата свідомості впродовж однієї хвилини. Яке ускладнення під час лікування виникло в пацієнта?

24. Під час лікування гострого пульпіту 35 зуба під інфільтраційною анестезією пацієнт віком 26 років поскаржився на **головокружіння, шум у вухах, потемніння в очах**. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, холодний піт, пульс слабкий - 110/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., **втрата свідомості впродовж однієї хвилини**. Яке ускладнення під час лікування виникло в пацієнта?

А. Колапс

В. Анафілактичний шок

С. Непритомність

В. Гіперглікемічна кома

Е. Гіпоглікемічна кома

24. Під час лікування гострого пульпіту 35 зуба під інфільтраційною анестезією пацієнт віком 26 років поскаржився на **головокружіння, шум у вухах, потемніння в очах**. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, холодний піт, пульс слабкий - 110/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., **втрата свідомості впродовж однієї хвилини**. Яке ускладнення під час лікування виникло в пацієнта?

А. Колапс

В. Анафілактичний шок

С. Непритомність

В. Гіперглікемічна кома

Е. Гіпоглікемічна кома

25. Чоловіку віком 45 років лікар-стоматолог виготовляє мостоподібний протез на нижню щелепу через відсутність 44, 45 зубів. Перед препаруванням опорних зубів проведено знеболювання. За декілька хвилин після анестезії пацієнт поскаржився на погане самопочуття, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, виступив холодний піт, кінцівки холодні, пульс ниткоподібний, мускулатура атонічна, свідомість збережена, але пацієнт апатичний. АТ - 80/40 мм рт. ст. Який невідкладний стан, імовірно, розвинувся?

25. Чоловіку віком 45 років лікар-стоматолог виготовляє мостоподібний протез на нижню щелепу через відсутність 44, 45 зубів. Перед препаруванням опорних зубів **проведено знеболювання**. За декілька хвилин після анестезії пацієнт поскаржився на погане самопочуття, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, виступив холодний піт, кінцівки холодні, пульс ниткоподібний, мускулатура атонічна, **свідомість збережена, але пацієнт апатичний. АТ - 80/40 мм рт. ст.** Який невідкладний стан, імовірно, розвинувся?

- А. Гостре порушення мозкового кровообігу
- В. Непритомність
- С. Анафілактичний шок
- Д. Колапс
- Е. Токсичний прояв

25. Чоловіку віком 45 років лікар-стоматолог виготовляє мостоподібний протез на нижню щелепу через відсутність 44, 45 зубів. Перед препаруванням опорних зубів **проведено знеболювання**. За декілька хвилин після анестезії пацієнт поскаржився на погане самопочуття, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, виступив холодний піт, кінцівки холодні, пульс ниткоподібний, мускулатура атонічна, **свідомість збережена, але пацієнт апатичний. АТ - 80/40 мм рт. ст.** Який невідкладний стан, імовірно, розвинувся?

А. Гостре порушення мозкового кровообігу

В. Непритомність

С. Анафілактичний шок

Д. Колапс

Е. Токсичний прояв