

Профілактика туберкульозу

Мати хлопчика 6 місяців прийшла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень.

Скарг не мають. Об'єктивно: температура - $37,1^{\circ}\text{C}$, частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зріст та вага відповідають діапазону між 50 та 75 перцентилем.

Відповідно до нормативно-правових документів МОЗ, якої тактики має дотримуватися лікар щодо імунізації цієї дитини?

Мати хлопчика **6 місяців** прийшла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина **не отримувала жодних щеплень**. Скарг не мають.

Об'єктивно: температура - 37,1°C, частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зріст та вага відповідають діапазону між 50 та 75 перцентилем.

Відповідно до нормативно-правових документів МОЗ, якої **тактики** має дотримуватися **лікар щодо імунізації** цієї дитини?

- Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень
- Провести пробу Манту та записати на прийом через 2-3 дні
- Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
- Ввести вакцину БЦЖ
- —

Мати хлопчика **6 місяців** прийшла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина **не отримувала жодних щеплень**. Скарг не мають.

Об'єктивно: температура - 37,1°C, частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зріст та вага відповідають діапазону між 50 та 75 перцентилем.

Відповідно до нормативно-правових документів МОЗ, якої **тактики** має дотримуватися **лікар щодо імунізації** цієї дитини?

- Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень
- **Провести пробу Манту та записати на прийом через 2-3 дні**
- Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
- Ввести вакцину БЦЖ
- —

На прийом до педіатра звернулась мати з 4-місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до 37,5°C. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації виявлено, що у дитини немає щеплення проти туберкульозу.

В які часові терміни повинно було бути проведене щеплення проти туберкульозу?

На прийом до педіатра звернулась мати з 4-місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до 37,5°C. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації виявлено, що **у дитини немає щеплення проти туберкульозу.**

В які **часові терміни** повинно було бути проведене **щеплення проти туберкульозу?**

- Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження
- Протягом першого тижня життя
- Протягом перших 24 годин життя
- Доношена дитина, 3-5 доба життя
- Протягом перебування в пологовому будинку після попередньої проби Манту

На прийом до педіатра звернулась мати з 4-місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до 37,5°C. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації виявлено, що **у дитини немає щеплення проти туберкульозу.**

В які **часові терміни** повинно було бути проведене **щеплення проти туберкульозу?**

- Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження
- Протягом першого тижня життя
- Протягом перших 24 годин життя
- **Доношена дитина, 3-5 доба життя**
- Протягом перебування в пологовому будинку після попередньої проби Манту

Недоношена дитина народилася з масою 1900 г.
Переведена у відділення патології новонароджених для
подальшого лікування з діагнозом «перинатальна
гіпоксична енцефалопатія». Щеплення БЦЖ в пологовому
будинку не проводилося.

Коли слід щеплювати дану дитину проти туберкульозу?

Недоношена дитина народилася з масою 1900 г. Переведена у відділення патології новонароджених для подальшого лікування з діагнозом «перинатальна гіпоксична енцефалопатія».

Щеплення БЦЖ в пологовому будинку не проводилося.

Коли слід щеплювати дану дитину проти туберкульозу?

- Після усунення ознак неврологічної патології
- У віці 6 місяців
- Коли маса тіла збільшиться до 2500 г
- Коли їй виповниться 1 рік
- Не щеплювати дитину взагалі

Недоношена дитина народилася з масою 1900 г. Переведена у відділення патології новонароджених для подальшого лікування з діагнозом «перинатальна гіпоксична енцефалопатія».

Щеплення БЦЖ в пологовому будинку не проводилося.

Коли слід щеплювати дану дитину проти туберкульозу?

- Після усунення ознак неврологічної патології
- У віці 6 місяців
- Коли маса тіла збільшиться до 2500 г
- Коли їй виповниться 1 рік
- Не щеплювати дитину взагалі

Семирічна дівчинка була в контакті з матір'ю, хворою на інфільтративний туберкульоз легень, фаза розпаду, МБТ (+).

Проба Манту з 2 ТО ППД-Л негативна.

Який лікарський засіб потрібно призначити дівчинці для проведення первинної профілактики?

Семирічна дівчинка була в **контакті з матір'ю, хворою на інфільтративний туберкульоз легень**, фаза розпаду, МБТ (+).

Проба Манту з 2 ТО ППД-Л негативна.

Який **лікарський засіб** потрібно призначити дівчинці **для проведення первинної профілактики**?

- Рифампіцин
- Піразинамід
- Етамбутол
- Етіонамід
- Ізоніазид

Семирічна дівчинка була в **контакті з матір'ю, хворою на інфільтративний туберкульоз легень**, фаза розпаду, МБТ (+).

Проба Манту з 2 ТО ППД-Л негативна.

Який **лікарський засіб** потрібно призначити дівчинці **для проведення первинної профілактики**?

- Рифампіцин
- Піразинамід
- Етамбутол
- Етіонамід
- **Ізоніазид**