

КРОК – 2

Нові тестові завдання

Хвора 35-ти років захворіла гостро з лихоманки до 39,0°C та кашлю. Через 3 дні задишка спокою зросла до 35/хв. Вниз від кута правої лопатки перкуторно визначається тупий звук, відсутнє голосове тремтіння, дихальні шуми не вислуховуються.

Яка тактика лікування?

Хвора 35-ти років захворіла гостро з лихоманки до 39,0°C та кашлю.

Через 3 дні **задишка спокою зросла до 35/хв. Вниз від кута правої лопатки перкуторно визначається тупий звук, відсутнє голосове тремтіння, дихальні шуми не вислуховуються.**

Яка тактика лікування?

- Фізіотерапія
- Штучна вентиляція легень
- Плевральна пункція
- Оксигенотерапія
- Антибіотикотерапія

Хвора 35-ти років захворіла гостро з лихоманки до 39,0°C та кашлю.

Через 3 дні **задишка спокою зросла до 35/хв. Вниз від кута правої лопатки перкуторно визначається тупий звук, відсутнє голосове тремтіння, дихальні шуми не вислуховуються.**

Яка тактика лікування?

- Фізіотерапія
- Штучна вентиляція легень
- **Плевральна пункція**
- Оксигенотерапія
- Антибіотикотерапія

Хлопчик 3 років доставлений до стаціонару у важкому стані. Об'єктивно: сомнолентність, гіперрефлексія, судоми, гіперестезія, невпинне блювання, температура тіла – 39,9°C, ЧСС – 160/хв., АТ – 80/40 мм.рт.ст.

Яке дослідження слід провести насамперед?

Хлопчик 3 років доставлений до стаціонару у важкому стані.
Об'єктивно: **сомнолентність, гіперрефлексія, судоми, гіперестезія, невинне блювання**, температура тіла – 39,9°C, ЧСС – 160/хв., АТ – 80/40 мм.рт.ст.

Яке дослідження слід провести насамперед?

- Ехоенцефалографія
- Реоенцефалографія
- Комп'ютерна томографія мозку
- Люмбальна пункція
- Рентгенографія черепа

Хлопчик 3 років доставлений до стаціонару у важкому стані.
Об'єктивно: **сомнолентність, гіперрефлексія, судоми, гіперестезія, невинне блювання**, температура тіла – 39,9°C, ЧСС – 160/хв., АТ – 80/40 мм.рт.ст.

Яке дослідження слід провести насамперед?

- Ехоенцефалографія
- Реоенцефалографія
- Комп'ютерна томографія мозку
- **Люмбальна пункція**
- Рентгенографія черепа

У хворого 48-ми років під час профілактичного огляду на рентгенографії ОГК у паренхімі верхньої частки правої легені виявлена промениста тінь до 7 см у діаметрі, яка прилягає до грудної стінки.

Який діагностичний метод найбільш інформативний?

У хворого 48-ми років під час профілактичного огляду на рентгенографії ОГК у паренхімі верхньої частки правої легені виявлена промениста тінь до 7 см у діаметрі, яка прилягає до грудної стінки.

Який діагностичний метод найбільш інформативний?

- Діагностична торакотомія
- Трансторакальна пункція
- Аналіз мокроти на клітини злоякісного новоутворення
- Визначення онкомаркерів
- Фібробронхоскопія

У хворого 48-ми років під час профілактичного огляду на рентгенографії ОГК у паренхімі верхньої частки правої легені виявлена промениста тінь до 7 см у діаметрі, яка прилягає до грудної стінки.

Який діагностичний метод найбільш інформативний?

- Діагностична торакотомія
- Трансторакальна пункція
- Аналіз мокроти на клітини злоякісного новоутворення
- Визначення онкомаркерів
- Фібробронхоскопія